

Tabel 2: Overzicht diagnostiek bij PrEP-gebruik

	Bij start PrEP	Na 1 maand	6-maandelijks	12-maandelijks	3 maanden na staken PrEP
4 ^e generatie hiv-combotest	X	X	X ¹		X
Soa (syfilisserologie, NAAT chlamydia/gonorrroe)	X		X ¹		
HCV (anti-HCV of indien doorgemaakt HCV-RNA)	X		Indien verhoogd risico op HCV ²	X	
HBV-status en -vaccinatie	X				
Nierfunctie (kreatinine, eGFR volgens CKD-EPI)	X			Op indicatie ³	
Urinestick (proteïne)	Op indicatie ³			Op indicatie ³	

¹ Controles voor hiv en bacteriële soa vinden in principe zesmaandelijks plaats, maar op indicatie kan middels *shared decision making* gekozen worden het interval te verkorten, bij klachten van -of partnertificatie voor- een soa of verdenking (acute) hiv-infectie (Box 2, www.hebikhiv.nl), of (verdenking op) inadequate therapietrouw (Hst. 6);

² Bijvoorbeeld indien er sprake is injecterend drugsgebruik, chemseks of groepsseks en/of delen van sekspeeltjes(10);

³ Indicaties voor urinestick bij start en ten minste jaarlijkse controle van nierfunctie en proteinurie: leeftijd ≥50 jaar, nefrotoxische comedicatie, eGFR<90 mL/min/1,73m² en/of renale comorbiditeit (hypertensie, diabetes of cardiovasculaire voorgeschiedenis).