

Tabel 1: Samenvattingskaart MDR PrEP

Indicatie- stelling	Ieder verzoek om PrEP dient serieus genomen te worden. In ieder geval komen in aanmerking: - Mannen en trans personen die seks hebben met mannen of trans personen, met in de afgelopen 6 maanden: - insertieve of receptieve anale seks zonder condoom met een partner met onbekende hiv-status of een onbekende of bekend detecteerbare viral load; - een rectale soa of infectieuze syfilis; - een voorgeschreven post-expositie profylaxe (PEP) kuur; - chemseks. Hiernaast alle andere mensen die een substantieel risico op hiv lopen, bijvoorbeeld omdat zij: (ook) seks hebben met MSM, trans personen of personen afkomstig uit een gebied met hoge hiv-prevalentie.
Bij start	4^e generatie hiv-combotest. NB: zorg dat de PrEP-gebruiker goed bereikbaar is in geval van een afwijkende uitslag; - HBV-screening en evt. vaccinatie; - Geen symptomen van een acute hiv-infectie (zie Box 2); - Geen gecontra-indiceerde comedicatie; - Soa-screening (serologie voor HCV en syfilis, NAAT chlamydia en gonorroe); - Nierfunctie (kreatinine en eGFR volgens CKD-EPI); - Urinestick (proteïne) indien: ≥ 50 jaar, nefrotoxische comedicatie, $eGFR < 90$ mL/min/1,73m² of renale comorbiditeit¹.
Dosering	- Dagelijks 1 tablet emtricitabine/tenofoviridisoproxil 200 / 245 mg, bescherming vanaf 5 dagen¹; óf 2 tabletten 2 uur vóór seksueel contact, gevolgd door dagelijks 1 tablet t/m 2 dagen na het laatste contact.
Follow-up	1 maand na start 4^e generatie hiv-combotest. Iedere 6 maanden² 4^e generatie hiv-combotest & soa-screening; - HCV-screening indien verhoogd risico³. Iedere 12 maanden - Nierfunctie en urinestick (proteïne) indien: ≥ 50 jaar, nefrotoxische comedicatie, $eGFR < 90$ mL/min of renale comorbiditeit⁴; - HCV-screening bij alle PrEP-gebruikers.

¹ Bij (neo)vaginale seks vanaf 7 dagen;

² Interval kan op basis van de individuele situatie verkort worden, bij klachten van -of partnertificatie voor- een soa of verdenking (acute) hiv-infectie (Box 2, www.hebikhiv.nl), of (verdenking op) inadequate therapietrouw (Hst. 6);

³ Bijvoorbeeld indien er sprake is van injecterend drugsgebruik, chemseks, groepsseks en/of delen van sekspeeltjes(10);

⁴ Hypertensie, diabetes of cardiovasculaire voorgeschiedenis.